

山东省泰安地区的一些害虫病毒

孙发仁

(山东省泰安地区农科所)

1979至1982年,从泰安地区为害粮、菜和果林的害虫体内分离到一些害虫病毒,经鉴定均属杆状病毒属(*Baculovirus*)A、B亚组。现将18种害虫病毒的分离鉴定结果(见图1—12)简述如下。

1. 红绿灯蛾核型多角体病毒(*Amsacia lacticinea* NPV):病虫症状为液化型,多角体多为四边形,直径平均 1.7μ ,为多粒包埋病毒,病毒束杆状,约 $350-380\times 110-90\text{nm}$ 。

2. 小地老虎核型多角体病毒(*Agrotis ypsilon* NPV):多角体呈五、六边形和圆形,直径平均 1.8μ ,病毒杆状,约 $360\times 50\text{nm}$ 。

3. 霜天蛾颗粒体病毒(*Psilogramma menephoron* GV):颗粒体椭圆形,多数一头较宽,约 $230-270\times 400-500\text{nm}$,病毒直杆状,约 $300\times 50\text{nm}$ 。

4. 桑褐刺蛾核型多角体病毒和颗粒体病毒

(*Seirora postorna* a NPV 和 GV):多角体呈三、五边形和圆形,平均 1.8μ ,病毒杆状,约 $275\times 65\text{nm}$,为单粒包埋;颗粒体椭圆形,约 $180-210\times 320-360\text{nm}$,病毒杆状,稍弯,约 $280-310\times 50-60\text{nm}$ 。

5. 杨毒蛾核型多角体病毒(*Leucoma salicis* NPV):多角体三、四边形,平均 1.8μ ,病毒粒杆状,约 $260\times 45\text{nm}$ 。

6. 黄地老虎颗粒体病毒(*Agrotis segetum* GV):颗粒体椭圆形。卵圆形,约 $0.4-0.6\times 0.2-0.3\mu$,病毒杆状,微弯,有的呈马蹄形,约 $320\times 70\text{nm}$ 。

7. 绿尾大蚕蛾颗粒体病毒(*Actias selene ringpoara* GV):病虫症状为液化型。颗粒体椭圆形,有的有疣状突起,约 $175-250\times 300-450\text{nm}$ 。

NPV: 核型多角体病毒; GV: 颗粒体病毒。




图 1. 红绿灯蛾核型多角体的形态, 3000 \times
 图 2. 桑褐刺蛾颗粒体病毒包涵体形态, 11360 \times , 右下方为病毒粒子
 图 3. 桑褐刺蛾核型多角体示单粒包埋病毒, 20000 \times
 图 4. 霜天蛾颗粒体病毒的包涵体, 20000 \times
 图 5. 绿尾大蚕蛾颗粒体病毒的包涵体, 20000 \times
 图 6. 扁刺蛾核型多角体形态, 7500 \times
 图 7. 豆天蛾核型多角体病毒粒子, 21000 \times
 图 8. 云斑粉蝶颗粒体病毒的包涵体, 6250 \times
 图 9. 柑桔凤蝶核型多角体病毒粒子, 90000 \times
 图 10. 小菜蛾颗粒体病毒的包涵体, 12000 \times
 图 11. 烟夜蛾核型多角体示单粒包埋病毒, 31000 \times
 图 12. 黄刺蛾核型多角体示多粒包埋病毒, 53000 \times

nm, 病毒粒子杆状, 约 250 \times 55nm。

8. 烟夜蛾核型多角体病毒(*Heliothis assulta* NPV):

病虫黄白至黄褐色。多角体不规则状,

直径平均 1.7 μ , 病毒粒子约 360 \times 60nm, 为单粒包埋病毒。

9. 云斑粉蝶颗粒体病毒 (*Pontia daplidice*

GV): 颗粒体椭圆、卵圆形, 约 $285-500 \times 150-300$ nm, 病毒杆状, 约 $190-250 \times 45-65$ nm。

10. 杨扇舟蛾颗粒体病毒 (*Clostera anachoreta* GV): 颗粒体椭圆形, 约 310×180 nm, 病毒粒子杆状, 约 210×78 nm。

11. 豆天蛾核型多角体病毒 (*Clanis bilineata tsirgauica* NPV): 多角体六边形至近圆形, 直径 $0.6-2.2\mu$, 病毒杆状, 约 320×50 nm。

12. 扁刺蛾核型多角体病毒 (*Thasea sinensis* NPV): 病虫黄白色, 胞包状。多角体呈三、五边形、近圆形, 平均 1.6μ , 病毒杆状, 约 340×70 nm, 为单粒包埋病毒。

13. 柑桔凤蝶核型多角体病毒 (*Papilio xuthus* NPV): 多角体呈四、五边至近圆形, 直径 $1.6-4\mu$, 病毒粒子杆状, 约 360×45 nm, 为多粒

包埋病毒。

14. 大蓑蛾核型多角体病毒 (*Cryptotache variegata* NPV): 多角体近圆球形, 约 $0.6-1.5\mu$, 病毒杆状, 约 400×80 nm, 单粒包埋。

15. 褐边绿刺蛾颗粒体病毒 (*Parasa consocia* GV): 颗粒体椭圆形, 约 310×200 nm, 病毒粒子杆状, 约 $160-200 \times 36-40$ nm。

16. 小菜蛾颗粒体病毒 (*Plutella xylostella* GV): 颗粒体椭圆形, 大小约 $0.4-0.45 \times 0.25-0.28\mu$, 病毒杆状, 约 300×50 nm。

17. 黄刺蛾核型多角体病毒 (*Cnidocampa flavescens* NPV): 病虫似脓疱, 易破碎。多角体四边形和圆形, 平均 1.7μ , 病毒粒子杆状, 约 330×60 nm。